

Referenties:

1. Rehman Q, Lane NE. Effect of glucocorticoids on bone density. Med Pediatr Oncol 2003;41:212-216.
2. Yonemura K, Kimura M, Miyaji T, Hishida A. Short-term effect of vitamin K administration on prednisolone-induced loss of bone mineral density in patients with chronic glomerulonephritis. Calcif Tissue Int 2000;66:123-128.
3. Yonemura K, Fukasawa H, Fujigaki Y, Hishida A. Protective effect of vitamins K2 and D3 on prednisolone-induced loss of bone mineral density in the lumbar spine. Am J Kidney Dis 2004;43:53-60.
4. Sato Y, Honda Y, Kaji M, et al. Amelioration of osteoporosis by menatetrenone in elderly female Parkinson's disease patients with vitamin D deficiency. Bone 2002;31:114-118.
5. Sato Y, Honda Y, Kuno H, Oizumi K. Menatetrenone ameliorates osteopenia in disuse-affected limbs of vitamin D- and K-deficient stroke patients. Bone 1998;23:291-296.
6. M..H.J. Knapen, N.E. Drummen, E. Smit, C. Vermeer, E. Theuwissen. Three year low-dose menaquinone-7 supplementation helps decrease bone loss in healthy menopausal women. Osteoporosis International. March 2013.
7. Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. Combined treatment with vitamin K2 and bisphosphonate in postmenopausal women with osteoporosis. Yonsei Med J 2003;44:751-756.
8. Hiruma Y, Nakahama K, Fujita H, Morita I. Vitamin K2 and geranylgeraniol, its side chain component, inhibited osteoclast formation in a different manner. Biochem Biophys Res Commun 2004;314:24-30.
9. 9. Seyama Y, Horiuchi M, Hayashi M, Kanke Y. Effect of vitamin K2 on experimental calcinosis induced by vitamin D2 in rat soft tissue. Int J Vitam Nutr Res 1996;66:36-38.
10. 10. Kawashima H, Nakajima Y, Matubara Y, et al. Effects of vitamin K2 (menatetrenone) on atherosclerosis and blood coagulation in hypercholesterolemic rabbits. Jpn J Pharmacol 1997;75:135-143.
11. 11. J.W.J. Beulens, M.L. Bots, F. Atsma, M-L. E.L. Bartelink, M. Prokop, J. M. Geleijnse, J.C.M. Witteman, D. E. Grobbee, Y.T. van der Schouw. High dietary menaquinone intake is associated with reduced coronary calcification. Atherosclerosis, April 2009 (Vol. 203, Issue 2, 489-493)
12. 12. J.M. Geleijnse et al. Dietary intake of vitamin K-2 reduces the risk of cardiac events and aortic atherosclerosis: The Rotterdam Study. Journal of Nutrition 134 (2004) 3100-3105.
13. 13. Knapen MH, Braam LA, Drummen NE, Bekers O, Hoeks AP, Vermeer C. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women: double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015 Feb 19;113(5). [Epub ahead of print]
14. 14. Cundiff DK, Agutter PS. Cardiovascular Disease Death Before Age 65 in 168 Countries Correlated Statistically with Biometrics, Socioeconomic Status, Tobacco, Gender, Exercise, Macronutrients, and Vitamin K. Cureus. 2016 Aug 24;8(8):e748. doi: 10.7759/cureus.748.



Platinum Nutri

transparantiefiche

Vitamine K2 Platinum



transparantiefiche

Vitamine K2 Platinum



- draagt bij tot het behoud van normale botten
- ondersteunt de circulatie

Vitamine K2:

Werking (toegelaten claims):

- Draagt bij tot het behoud van normale botten: vitamine K2 activeert via carboxylatie het eiwit osteocalcine dat calcium uit het bloed haalt en in de botten vastzet
- Ondersteunt de circulatie: vitamine K2 activeert via carboxylatie het eiwit Matrix GLA-proteïne dat calcium uit de vaatwand houdt
- **Dagdosis** (1 caps): 210 mcg (280 % RI)
- **Kwaliteit:** 'all trans menaquinone-7', de bioactieve vorm van vitamine K2 (K2Vital™)
- **Wetenschappelijke ondersteuning:**
- Botgezondheid: 1 – 8
- Normale circulatie en vaatwanden: 9 - 14

Actief ingrediënt per vegetarische capsule:

210 mcg vitamine K2 als 'all trans menaquinone-7' (K2Vital™, 280 % RI*)

*RI = Referentie-inname

Hulpingrediënten: extra vierge olijfolie, capsulewand (gemodificeerd zetmeel, stabilisator: glycerol)

Gebruik:

1 capsule per dag bij een hoofdmaaltijd, met een glas water.

Inhoud:

60 V-capsules

NUT_PL 47/567

CLEAN LABEL

Hoe VITAMINE K2 PLATINUM inzetten voor meer succes?

- *Ter ondersteuning van de botgezondheid:*
- met VITAMINE D3 PLATINUM (opname van calcium) en/of SILICIUM PLATINUM (bioactieve silicium) en/of MSM PLATINUM (organische zwavel)
- met het totaalpreparaat OSTEOTON FORTE (dat ook vit K2 bevat) en daarnaast vitamine D3, bioactieve calcium uit Lithothamnium calcareum en het mineraal boor aanvoert
- met COLLAGEN PLATINUM: gehydrolyseerde viscollageen
- met MENOTON: dat hopextract aanvoert ter verlichting van overgangsklachten
- *Ter ondersteuning van de circulatie:* met KYOLIC EPA +K2 of KYOLIC PLATINUM of KYOLIC + LECITHINE en/of NATTOKINASE PLATINUM en/of OMEGA-3 PLATINUM VISOLIE of ALGENOLIE en/of OPC PLATINUM en/of UBIQUINOL PLATINUM en/of VITAMINE E PLATINUM